

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9\\_ne%C5%A1tovice](https://cs.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A9_ne%C5%A1tovice)

Doplnění textu:

Léčba planých neštovic je pouze symptomatická-používáme tedy léky, které uleví obtížím.

Při svěžení kůže na puchýřky lze použít Tanno-Hermal lotio nebo Vira soothe gel, případně tekutý pudr.

Celkově se užívá Fenistil kapky, Zyrtec kapky nebo tablety, Zodac, Xyzal, Desloratadin, Alerius-jen při výrazném svěžení.

Při teplotě nad 38 st.-Paralen nebo Ibalgin v sirupu nebo čípku či tabletě.

Po dobu výsevu puchýřů není vhodné koupání-lépe sprchovat vlažnou vodou bez mýdla, opatrně usušit ,aby se nestrhaly puchýře a poté namazat k zasychání gelem nebo mlékem-viz výše.

Infekčnost je největší těsně před výsevem puchýřů a končí po úplném zaschnutí poslední neštovice.

Je vhodné nechat dítě minimálně 2-3 týdny od výsevu mimo kolektiv, protože imunitní systém je po neštovicích významně oslaben a děti jsou mnohem vnímavější k jiným infekcím.

Po zaschnutí poslední neštovice je vhodné vykoupat dítě ve vaně, kdy se odloučí přebytečné stroupky a poté začít intenzivně promašťovat kůži k rychlejší regeneraci.

Po zaschnutí neštovic je také možné podpořit imunitní systém podáváním vitamínů- hlavně sk. C- minimálně na 2-3 týdny, a doplnění léků podporujících imunitu: Imunoglukan sirup, Echinacea sirup atd.

Plané neštovice jsou infekční dětské onemocnění, které podléhá hlášení hygienické stanici.

pokud Vaše dítě onemocnělo, informujte o tom jeho praktického lékaře, případně si domluvte kontrolu po doléčení před nástupem do kolektivu.